

Izjava pristanka na uzimanje tableta sa kalijumovim jodidom

Dragi roditelji! Dragi staratelji!

Reaktorska nesreća u Černobilu je usled zračenja dovela do snažnog porasta raka štitnjače kod dece i omladine u jako opterećenim područjima oko Černobila. Uzrok ovoga razvoja je radioaktivan jod, koji se kod teških reaktorskih nesreća oslobađa u velikim količinama. Nakon ulaska u telo jod se taloži u štitnjači, gde dovodi do visokog stepena lokalnog opterećenja zračenjem.

Blagovremeno uzimanje tableta sa kalijumovim jodidom štitnjaču zasićuje stabilnim jodom i na taj način sprečava taloženje radioaktivnog joda. Opterećenje štitnjače zračenjem, a time i nastanak raka štitnjače usled zračenja praktično su spuštani na nulu. Mora međutim biti zadovoljen uslov da tablete budu uzimane pre dolaska radioaktivnog oblaka.

Blagovremeno uzimanje tableta sa kalijumovim jodidom pruža vrlo efikasnu zaštitu od zračenjem izazvanog raka štitnjače.

U cilju omogućavanja blagovremenog uzimanja, tablete sa kalijumovim jodidom se skladište u školama i internatima. Davanje ovih tableta Vašem detetu međutim može da usledi isključivo uz Vaš prethodni pristanak. Potpisivanjem dole navedene izjave pristanka možete omogućiti davanje dotičnih tableta Vašem detetu.

U slučaju reaktorske nesreće davanje tableta sa kalijumovim jodidom usleđuje isključivo nakon izričitog zahteva od strane odgovarajuće službe za zdravstvo.

Molimo da pre davanja pristanka pažljivo pročitate priložene navode iz informacija za upotrebu tableta sa kalijumovim jodidom.

Direkcija

IZJAVA PRISTANKA

Ime deteta: _____ Datum rođenja: _____

Ime staratelja: _____

DA, izjavljujem pristanak (za vreme trajanja pohađanja ustanove), da se mome detetu nakon zahteva od strane službe za zdravstvo smeju davati tablete sa kalijumovim jodidom. Potvrđujem, da mi za moje dete nisu poznate nepodnošljivosti i kontraindikacije kod uzimanja tableta, i da ću u slučaju doznavanja za nepodnošljivosti ili kontraindikacija neodložno o tome da obavestim školu.

NE, ne izdajem pristanak

Datum: _____ Potpis: _____

Informacija uz tablete sa kalijumovim jodidom (sadržaj iz informacije za upotrebu)

Tablete sa kalijumovim jodidom ne smeju biti uzimane:

- u slučaju **Hipertireoze štitnjače**
- kod **benignih čvorova u štitnjači**, koji nisu podvrgnuti tretmanu ili lečenju. Kod takozvanih nelečenih „vrućih čvorova u štitnjači“ postoji opasnost masivne hiperprodukcije hormona štitnjače, koja u najgorem slučaju može da dovede do reakcija srca i krvotoka opasnih po život.
- u slučaju sumnje na **maligni tumor štitnjače**. Tumori štitnjače se leče radioaktivnim jodom. Ako se kalijumov jodid uzima u velikim količinama, to može da onemogući lečenje tumora.
- u slučaju **alergije** (preosetljivosti) na jod. To je vrlo retka pojava i ne sme biti zamenjena sa učestalom alergijom na kontrastna sredstva (sredstva koja služe za bolji prikaz raznih organa u slikovnim postupcima, na primer u rendgenskoj dijagnostici).
- kod **alergije** na neki od ostalih sastojaka tableta (kukuruzni škrob, monohidrat laktoze, mikrokristalinska celuloza, bazični butilmetakrilat-kopolimer, magnezijumov stearat)
- kod **Dermatitis herpetiformis Duhring** (obolenje, kod kojeg se pojavljuju mehurići, crvenilo kože, kožni osip i snažno pečenje uz svrab, posebno na laktovima i kolenima)
- kod alergijama izazvanih **upala zidova krvnih sudova** (hipokomplementemični vaskulitis)

Poseban oprez kod uzimanja tableta sa kalijumovim jodidom je potreban:

- kod obolenja koje je zahvatilo **dušnik**. Davanje joda može da izazove rast štitnjače, a to bi još pogoršalo postojeće suženje dušnika.
- ako se Vaše dete leči sa **sredstvima za inhibiciju štitnjače (tireostaticima)**, onda molimo da pitate Vašeg lekara/Vašu lekarku, da li Vaše dete sme da uzima tablete sa kalijumovim jodidom.

Uzimanje tableta sa kalijumovim jodidom zajedno sa drugim lekovima

- **Na delovanje tableta sa kalijumovim jodidom utiču:**
Lekovi koji deluju na razmenu tvari u štitnjači (na primer perklorat, tiocianat u koncentraciji većoj od 5 mg/dl). Ovi lekovi usporavaju primanje joda od strane štitnjače).
- **Tablete sa kalijumovim jodidom utiču na dejstvo od:**
Sredstava za inhibiciju štitnjače (tireostatici)

Koje nuspojave su moguće?

Kao svi lekovi tablete sa kalijumovim jodidom mogu da izazovu nuspojave, koje se međutim ne moraju pojaviti kod svakoga. Kod ocenjivanja nuspojave se primenjuju sledeći navodi učestalosti:

- **vrlo česte** (pojavljuju se kod više od 1 od 10 pacijenata)
- **česte** (pojavljuju se kod više od 1 od 100, ali kod manje od 1 od 100 pacijenata)
- **povremene** (pojavljuju se kod više od 1 od 1.000, ali kod manje od 1 od 100 pacijenata)
- **retke** (pojavljuju se kod više od 1 od 10.000, ali kod manje od 1 od 1.000 pacijenata)
- **vrlo retke** (pojavljuju se kod manje od 1 od 10.000 pacijenata)

Obolenja želučano-crevnog trakta

Nadražaj želučane sluzokože može da nastupi posebno u slučaju uzimanja tableta sa kalijumovim jodidom na prazan želudac.

Hormska obolenja

Vrlo retko: hipertireoza usled joda. Znakovi hipertireoze štitnjače mogu biti ubrzani puls, znojenje, nesanica, drhtavica, proliv i gubitak telesne težina unatoč povećanom apetitu.

Obolenja krvnih sudova

Retko: upale krvnih sudova (npr. Periarteriitis nodosa)

Obolenja imunološkog sistema

Retko: prethodno nepoznata alergija na jod može nastupiti po prvi puta. Pritom može doći do alergičnih pojava kao što su na primer crvenilo kože, svrbež i pečenje očiju, hunjavica, nadražaj na kašalj, proliv, glavobolja i slični simptomi. Posebno u slučaju postojeće bolesti Dermatitis herpetiformis Duhring (obolenje, kod kojeg između ostalog dolazi do pojave mehurića i crvenila kože, prvenstveno na laktovima ili kolenima) su moguće reakcije opasne po život (vidi gore: tablete sa kalijumovim jodidom ne smeju se uzimati).

Generalno važi:

Pitajte Vašeg lekara/Vašu lekarku ili Vašeg apotekara/Vašu apotekaricu, ako su Vam potrebne dodatne informacije ili saveti.